



〒830-0032 福岡県久留米市東町 496

TEL:0942(38)4181 FAX:0942(37)4131 e-mail:info@bdort.net URL:http://bdort.net

◎ 2006 年 4 月久留米セミナー及び東京セミナー報告

2006 年 4 月 8 日～9 日、福岡県久留米市の ORT 生命科学研究所にて、オーリングテストセミナーが開催され、4 月 9 日～10 日で認定試験が行われました。また、4 月 15 日～16 日に昭和大学医学部でアドバンス・セミナーが開催され、認定医の先生方の講演及び大村恵昭先生の最新の進歩及びデモンストレーションが行われました。久留米には、50 名、東京には、110 名の参加者が集まり、盛況のうちに終了しました。




久留米セミナー



Virtual Drug Effect Testで

右腕の正常な部分のTelomereが30ng及び臍臓の850ngと高い前癌状態のものが、いろいろな飲み物を持たせた結果、どのように変化するかを記録したもの。正常のTelomereがメカブを持った時、250ngに、大村先生がポルトガルのファティマからくんで来られた水では、300ngに上昇し、異常なTelomereは1ngに、インテグリンは100pgに低下した。



メカブとファティマからくんできた水



昭和大学医学部のセミナーに参加した参加者及び講演される大村恵昭先生



Asbestos 0.2mg でスクリーニングをして陽性だった人に
インテグリン 60ng で X-, Y-axis scanning をした結果。
中心部に Asbestos 0.5mg が反応している。

◎今回の来日で、大村恵昭先生が話されたトピック

①オーリングテストのグレーディングで強くなるものが必ずしも健康に良くない。

右の写真のお茶は、正常の Telomere (テロメア) を下げる。
本当に体にとっていいかどうかは、正常の Telomere を上げるか、下げるかでチェックしないといけない。

Integrin $\alpha_5\beta_1$ を下げるか、Acetylcholine を増やすか 等の
チェックも病状によっては、必要。



② 癌がいくつかの臓器にも転移しているような場合は、true ST.36 の刺激以外にどのようにしたらよいでしょうか？

- 両手を強く、こすり合わせる(摩擦熱がたくさん出るようにする)
- 両手をパン、パーンと強くたたく。

③ コーヒーやお茶は Telomere を下げる。

コーヒーを飲むと、約2時間くらいで正常の Telomere が下がり、もとにもどるまで、合計4時間くらいかかる。お茶は約30分で低下し、もとにもどるまで、約1時間かかる。

※ 診察の時に、正常の Telomere を測定したら、コーヒーやお茶等の Telomere を下げる飲料を飲んだり、食べていないかを患者に確認することが大切。

※ ニンジンも Telomere を下げる。

※ クラシックコカコーラは、Telomere を上げても下げもしない。

※ ファティマのミラクルウォーターは、Telomere を上げる。フランスのルルドの水も Telomere を上げる。アラスカ水も Telomere を上げる。

④ DHEA には、適量がある。DHEA について及び症例については、以下の Acupuncture & Electrotherapeutics の国際雑誌に掲載されている。

Beneficial effects and side effects of DHEA: true anti-aging and age-promoting effects, as well as anti-cancer and cancer-promoting effects of DHEA evaluated from the effects on the normal and cancer cell telomeres and other parameters. Acupunct Electrother Res. 2005;30(3-4):219-61.

個人差がありますが、適量は 3.75mg～12.5mg くらいと違いがある。

Anti-Aging Effect のあるものは、Anti-Cancer Effect がある。

◇ DHEA の適量の決め方

まず、DHEA の適量を決めたい人の腕で正常の Telomere を調べます。患者に DHEA を持たせて、正常の Telomere が 520ng～540ng まで増える時に適量と判断します。正常の Telomere が 520ng～540ng まで増えた時に、癌の Telomere 及び Integrin $\alpha_5\beta_1$ が 1yg 以下にまで低下する。

◇ DHEA の次回投与のしかた



DHEA は、毎日飲むとかえて癌を増進させる。DHEA は、1回飲むと効果が4カ月くらい持続する。アスピリン等の消炎鎮痛剤を服用すると、DHEA の効果がキャンセルされてしまう。タバコ、ビタミン C、中国パセリ、柴胡桂枝湯等は、DHEA の効果をキャンセルする。


DHEA の効果を妨げる物

- a) Smoking
- b) Additional DHEA (initial optimal dose or higher dose than optimal dose)
- c) Excessive dose of steroid hormones taken orally or used as a skin cream or ointment containing a large amount of steroid hormones (to reduce inflammation of skin)
- d) Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), including Aspirin (even with baby Aspirin), Tylenol (Acetaminophen), and Advil (Ibuprofen)
- e) Neurontin (Anticonvulsant with potential side effects) used for pain
- f) Topamax (Anticonvulsant with potential side effects) used for pain
- g) Vitamin C
- h) Synthroid (112 μ g or higher)
- i) Caffeine
- j) Vitamin E (over 200 IU)
- k) Saiko-Keishi-Tou (Tsumura 10)
- l) Cilantro (negative effect is less than baby Aspirin)
- m) Excessive doses of Folic Acid (more than 200-400 μ g, depending on the individual)
- n) Excessive doses of Vitamin B₁₂ (more than 350-750 μ g)
- o) Prolonged exposure to low temperatures
- p) Extreme physical exhaustion, including extreme tiredness of the eye
- q) Physical trauma
- r) Exposure to strong electromagnetic field from various electrical devices, including cellular phone, particularly while holding the phone and talking
- s) Wearing Bi-Digital O-Ring Test strong negative materials, including some of the following: underwear, necklace, watch with positive polarity of battery indirectly contacting body surface, hair dye, eyeglass, cosmetic materials, jewelry, socks
- t) Stress
- u) Watching a scary movie


1～2週間おきに正常の Telomere をチェックして、150ng 以下になった場合に、2回目以降の服用をする。※Handwriting や写真でのチェックは、相当訓練を積まないと難しいので、注意を要する。

DHEA による変化






DHEA 適量投与による各種パラメータの変化
(この患者では 10mg が適量)



⑤大村恵昭先生は、最近、1 年くらいの間に Glioblastoma Multiforme もしくは、Anaplastic Astrocytoma という脳腫瘍を 5 症例以上、発見されている。

大村恵昭先生の発見では、Glioblastoma Multiforme 及び Anaplastic Astrocytoma の中心部分には、アスベスト(Asbestos)が蓄積している。また、その部分には、砒素(Arsenic)も蓄積している。



Asbestos が蓄積している所には、Osteopontin という物質もたくさん蓄積している。左の写真で Asbestos が 0.25mg の所では、Osteopontin が 5ng ある。正常の所は 1ng 以下になるであろう。

Osteopontin is a [glycoprotein](#). It is overexpressed in a variety of [cancers](#), including [lung cancer](#), [breast cancer](#), [colorectal cancer](#), [stomach cancer](#), [ovarian cancer](#), [melanoma](#) and [mesothelioma](#). The prefix of the word "Osteo" indicates that the protein is expressed in bone, where it is one of the extracellular structural proteins, that constitutes the organic part of bone.

⑥Asbestos が蓄積している所には、Mesothelioma のスライドが共鳴する。

中皮腫 (Mesothelioma) には、大きく分けて Epithelioid mesothelioma tissue、Sarcomatoid mesothelioma tissue、及び両者が Mixed した Mixed mesothelioma tissue がある。Asbestos にたくさん接触した可能性のある人は、詳しく調べてもらった方がいい。

◎第7回BDORT国際シンポジウム・第 16 回日本BDORT医学会開催のお知らせ

7月14日から7月16日に第7回バイ・デジタルオーリングテスト国際シンポジウムが開催されます。抄録演題を募集いたしますので、別紙・開催要項及び演題募集要項をご参照の上、まずは至急、演題を御応募下さいようお願い申し上げます。

平成18年5月吉日

日本バイ・デジタルオーリングテスト協会会員各位殿

第7回 Bi-Digital O-Ring Test 国際シンポジウム
第 16 回日本 Bi-Digital O-Ring Test 医学会
大会会長 無敵 剛介

第7回BDORT国際シンポジウム・第 16 回日本BDORT医学会 演題ご提出のお願い

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜りますとともに、協会運営にご協力頂き深く感謝申し上げます。

さて、第7回Bi-Digital O-Ring Test国際シンポジウム開催もいよいよ間近となりました。先生におかれましては是非とも演題をご提出いただきたくお願い申し上げます。

まずは別紙・開催要項に目を通していただき、次にシンポジウムやパネルディスカッションのテーマについて次ページ以降をご確認の上、一般口演、シンポジウム、パネルディスカッションなどへの演題のご登録(複数可能)をお願い申し上げます。

準備の都合上、5月12日(金)までに、ご希望の発表形式をご選択され(複数可能)、発表演題とともに別紙にてお知らせくださるようお願い致します。テーマの追加のご希望があれば空欄にご記入下さい。

ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、よろしくご高配のほどお願い申し上げます。

敬具

<事務局>

日本Bi-Digital O-Ring Test協会
〒830-0032 福岡県久留米市東町496
TEL: 0942-38-4181 FAX: 0942-37-4131
E-Mail: info@bdort.net URL: <http://bdort.net>

⇒FAX 返信先:0942-37-4131

第7回BDORT国際シンポジウム・第16回日本BDORT医学会演題について

ご芳名:

ご所属:

演題名:

ご希望のセッションにマルをつける(複数歓迎)か、もしくは追加のテーマがございましたらご記入
いただいた上、ご自身の演題名を上欄にご記載くださいますようお願いいたします。

A)シンポジウムテーマ

1)BDORTと Individualized Disease Management

- イ)生活習慣病
- ロ)がん疾患
- ハ)感染症・免疫疾患
- ニ)噛み合わせの口腔医学的解析
- ホ)「証」と漢方(方証相対)

2)BDORTと生命科学

- イ)テロメアとアンチエイジング探究
- ロ)多病息災型健康増進
- ハ)健康長寿をめざすサプリメント薬力学
- ニ)鍼灸治療と気功の自然治癒力への影響
- ホ)笑いの生物学的解析
- ヘ)電磁波環境対策

3)BDORTと病態構造

- イ)難治性疼痛疾患群
- ロ)認知症
- ハ)慢性呼吸器疾患
- ニ)ストレス疾患
- ホ)感染症
- ヘ)歯周病
- ト)免疫・内分泌自律神経系疾患

B)パネルディスカッション(またはラウンドテーブル自由討論方式)

- 1)私のめざすBDORT医学
- 2)現代医学医療体制とBDORT医学との適合性
- 3)()

C)一般口演

<事務局>

日本 Bi-Digital O-Ring Test 協会

〒830-0032 福岡県久留米市東町 496

TEL:0942-38-4181 FAX:0942-37-4131

E-Mail: info@bdort.net URL: <http://bdort.net>